

Túrfrágreiðing - Magnus Heinason: Sild og svartkjaftur norðanfyri, túrur 0824, 30/4-14/5 2008

Fólk frá FRS.: Jan Arge Jacobsen, Leon Smith, Ebba Mortensen, Mourits Mohr Joensen, Høgni Debes og Fróði Skúvadal.

Ábyrgd: Jan Arge Jacobsen

Endamál: At kanna nøgdirnar av sild og svartkjafti í føroyskum øki norðanfyri í sambandi við altjóða kanningar av norðhavssild og svartkjafti í Norðuratlantshavi. Kanningarnar eru skipaðar undir ICES "Planning Group on Northeast Atlantic Pelagic Ecosystem Surveys" (PGNAPES), har Føroyar, Noreg, ES, Russland og Ísland luttaka.

Reiðskapur: Flótitrol við nýggjum svartkjaftaposa/belli og prikkafiskaposa/belli. CTD og WP2. Uppsamlingsposar (4 verða á trolinum). Ymisk mátitól til at máta gjøgnumstreyma í trolinum (Fróði). Laksatrol við posa og yngullemmum (boyur og fendarar). Í sambandi við at laksatrol við verður nýtt, verður ein netatrumla sett á dekkið.

Um túrin: Farið var í ein landnyrðing úr oyggjunum, har vit sigldu sambært **Mynd 1**. Siglingarleiðin hjá øllum luttakandi skipunum er víst á **Mynd 2**. Túrurin gekst væl.

Nøgdin av sild og svartkjafti verður mátað við ekkóloddi, sum verður talt saman við einum sokallaðum ekkóintegratori. Tølini úr honum verða roknað um til tons av fiski.

Norðhavssild

Nógv sild var at síggja í føroyskum øki í ár, eins og seinnu árin. Sildin stóð víða um og var at finna sum ein lind á 30-100 m dýpi, serliga í eystara parti av kannaða økinum, meðan sildin hevði tikið seg saman í stimar á 250-350 m dýpi í útnyrðingspartinum av økinum (**Mynd 3a**). Hesir stimar komu vanliga upp undir vatnskeppuna um náttina. Sildin var meira javnt býtt í økinum enn í fjør, serliga í syðra og eystara parti av kannaða økinum (**Mynd 3b**).

Ein fyribilsmeting av nøgdini av sild í kannaða økinum gevur umleið 4,9 milliónir tons, sum er ein vøkstur frá í fjør, tá metingin í kannaða økinum var 3,5 milliónir tons. Samlaða nøgðin av norðhavssild í Norðuratlantshavi, har tølini frá øllum skipunum verða við, verður roknað út á fundi í Danmark síðst í august.

Longdarbýti av norðhavssild er víst í **Mynd 4**, miðallongdin er 33 cm, og miðalvektin er 252 g. Sildin er hampiliga væl fyri til árstíðina (t.e. eftir gýtingina). Nakað av æti var í henni. Tann størri sildin var at finna í vestara og útnyrðingspartinum av kannaða økinum, eins og hini árin (**Mynd 9**).

Svartkjaftur

Tað var lítið av svartkjafti at síggja norðanfyri í ár. Úti á opnum havi var mest sum eingin svartkjaftur (**Mynd 5**). Tvey tey síðstu árin hevur sera lítið verið at sæð útiá. Longdarbýti av svartkjafti er víst í **Mynd 6**, miðallongdin er 29,6 cm og miðalvektin er 151 g.

Makrelur

Nakað av makreli (miðallongd 34,3 cm og miðalvekt 286 g, **Mynd 8**) stóð millum norðhavssildina nær vatnskeppuni í eystara parti av føroyskum øki yvir móti ES markinum og

í ES sjógvi (**Mynd 7**). Seinnu árinu er makrelur komin longur norður og vestur enn áður. Enntá í so stórarri nógð, at skipini illa hava fingið fiska sild norðanfyri. Tað er helst vøksturin í sjóvarhitanum seinnu árinu, ið føra til hesa broyting í útbreiðsluni av makreli.

Laksur

Laksur (17 stk.) var fingin í tveimum hállum við laksatrolinum, hetta var laksur, ið helst ikki fer upp í áirnar at gýta í ár. Støddin var um 30-50 cm (vekt ½ til 1 kg).

Prikkafiskur

Lítið av prikkafiski var at síggja norðanfyri.

Æti

Krill (*Meganyctiphanes norvegica*) var at síggja á djúpum vatni (250-500 m) í mest sum øllum økinum. Sum oftast var reyðæti ella *Calanus* spp. í sildini, men í einstøkum hállum var sildin full av krill. Nakað av amfipodum (*Themisto* sp.) var fingið í krilltrolið á djúpum vatni.

Hydrografi

Hitin í vatnskorpunum er vístur í **Mynd 9**, saman við miðallongdini av sild. Tann størri sildin er í kaldara sjónum, ella í vestara og norðara partinum av kannaða økinum. Hitin á 300 m dýpi sæst á **Mynd 10**.

Reiðskapskanningar


Umframt 4 uppsamlingsposar, ið sótu uttan á bellinum, sótu tvær ADCP'arar á trolinum, ein frammi á høvuðlínuni og ein aftari á bellinum. Hesar máta streymen í trolinum, bæði inni í og uttan fyri netið. Eisini var videokamera á trolinum í trimum hállum.

Sýnistøka: Trolað varð javnan fyri at greina sundur ekkóskriftina undir kanningunum, og 371 nytrur av sild, 40 nytrur av svartkjafti (allur svartkjafturin) og 95 nytrur av makreli til aldursgreining vórðu tiknar av veiðuni, 21 hál tilsamans. Sum liður í kanningunum av føðini hjá sild, svartkjafti og makreli eru 25 magar av sild, svartkjafti og makreli tiknir til kanningar av teimum hállum, har nytrur vórðu tiknar. Fyri at kanna møguliga smittukeldu av ILA, vórðu nakrir prøvar av prikkafiski, umframt táknur av 17 laksum, frystir til Debes Christiansen, HFS. Í alt 42 WP2 (plankton glúpur niður á 200m, tó niður á 50 m á standardskurðinum) og CTD-støðir (hita- og saltmátingar) vóru tiknar á túrinum, ella fyri umleið 50. hvønn fjórðing, ið siglt varð.


Nær verða sýnini liðugt viðgjørd: Sýnini verða arbeiðd í landi, og aldursgreinað tilfar skal fyriliggja skjótast gjørligt, og í seinasta lagi 23. mai. Hetta fyri at tølini kunnu nýtast til stovnsmetingar av norðhavssild og svartkjafti í felags túrfrágreiðingini seinni í summer.

Jan Arge Jacobsen


Magnus Heinason 14/5 2008




Mynd 1. Siglingarleiðin (reyðar strikur) og CTD-stöðir (gulir sirklar) hjá *Magnus Heinasyni* á silda- og svartkjaftatúrinum 30/4-14/5 2008. Tilsamans 31 CTD stöðir (umframt standarskurðin norður) og gott 2000 fjórðingar at sigla.




Mynd 2. Ætlaðar siglingarleiðir á altjóða silda- og svartkjaftakanningunum norðanfyri í mai-juni 2007. Luttakandi skipini umframt *Magnus Heinason* eru *G.O. Sars*, *Nybo*, *Dana* og *Árni Friðriksson*.




Mynd 3a. Ekkóvirðir av norðhavssild (s_A mm/nm²) á kanningunum norðanfyri 30/4-14/5 2008. Sirkclar vísa hvussu nógv sild stóð undir skipinum.




Mynd 3b. Ekkóvirðir av norðhavssild hagtalspúnt (0.5x1 gradir) á kanningunum norðanfyri 30/4-14/5 2008. Umroknað svarar hetta til umleið 4,9 milliónir tons.




Mynd 4. Longdarbýti av norðhavssild í føroyskum øki á túri 0824, 30/4-14/5 2008. Miðallongd 33,2 cm, miðalvekt 252 g.




Mynd 5. Ekkóvirðir av svartkjafti (s_A mm/nm²) á kanningunum norðanfyri 30/4-14/5 2008.




Mynd 6. Longdarbýti av svartkjafti í føroyskum øki á túri 0824, 30/4-14/5 2008. Miðallongd 29,6 cm og miðalvekt 151 g.




Mynd 7. Ekkóvirðir av makreli (s_A mm/nm²) á kanningunum norðanfyri 30/4-14/5 2008.



Mynd 8. Longdarbýti av makreli í føroyskum øki á túri 0824, 30/4-14/5 2008. Miðallongd 34,3 cm og miðalvekt 286 g.



Mynd 9. Hiti (°C) í vatnsörpuni og miðallongd av sild (cm), túrur 0824, 30/4-14/5 2008.



Mynd 10. Hitin ($^{\circ}\text{C}$) á 300 m dýpi, túrur 0824, 30/4-14/5 2008.